

**Mathematik I****Arbeitsblatt 25****Aufwärmaufgaben**

AUFGABE 25.1. Beweise das folgende *Minorantenkriterium*.

Es seien  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  und  $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$  zwei Reihen von nichtnegativen reellen Zahlen. Die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$  sei divergent und es gelte  $a_k \geq b_k$  für alle  $k \in \mathbb{N}$ . Dann ist auch die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  divergent.

AUFGABE 25.2. Seien  $a, b \in \mathbb{R}_+$ . Zeige, dass die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{ak + b}$$

divergiert.

AUFGABE 25.3. Zeige, dass die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

divergiert.

AUFGABE 25.4. Zeige, dass die Familie

$$\frac{1}{z^k z^\ell}, (k, \ell) \in \mathbb{N}^2,$$

summierbar ist.

AUFGABE 25.5. Berechne zur summierbaren Familie

$$\frac{1}{z^k z^\ell}, (k, \ell) \in \mathbb{N}^2,$$

die Teilsummen

$$s_k = \sum_{\ell \in \mathbb{N}} \frac{1}{z^k z^\ell}$$

zu jedem  $k \in \mathbb{N}$  und berechne  $\sum_{k \in \mathbb{N}} s_k$ .

AUFGABE 25.6. Zu  $j \in \mathbb{Z}$  sei

$$I_j = \{(k, \ell) \in \mathbb{N}^2 \mid k - \ell = j\}.$$

Berechne zu jedem  $j \in \mathbb{Z}$  zur summierbaren Familie

$$\frac{1}{z^k z^\ell}, (k, \ell) \in \mathbb{N}^2,$$

die Teilsommen

$$t_j = \sum_{(k,\ell) \in I_j} \frac{1}{z^k z^\ell}$$

und berechne  $\sum_{j \in \mathbb{Z}} t_j$ .

AUFGABE 25.7. Man mache sich klar, dass die Partialsummen des Cauchy-Produkts von zwei Reihen nicht das Produkt der Partialsummen der beiden Reihen sind.

AUFGABE 25.8. Es seien

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \text{und} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$$

zwei absolut konvergente Potenzreihen in  $z \in \mathbb{C}$ . Zeige, dass das Cauchy-Produkt der beiden Reihen durch

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad \text{mit} \quad c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

gegeben ist.

AUFGABE 25.9. Sei  $z \in \mathbb{C}$ ,  $|z| < 1$ . Bestimme (in Abhängigkeit von  $z$ ) die Summen der beiden Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^{2k} \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} z^{2k+1}.$$

AUFGABE 25.10. Bestimme die Koeffizienten bis zu  $z^6$  in der Produktreihe  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  aus der Sinusreihe und der Kosinusreihe.

AUFGABE 25.11. Es sei

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

eine absolut konvergente Potenzreihe. Bestimme die Koeffizienten zu den Potenzen  $z^0, z^1, z^2, z^3, z^4$  in der dritten Potenz

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right)^3.$$

AUFGABE 25.12. Zeige, dass die durch die Exponentialreihe definierte reelle Funktion

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \exp x,$$

nicht nach oben beschränkt ist und dass 0 das Infimum (aber nicht das Minimum) der Wertemenge ist.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Aus der Stetigkeit, die wir aber noch nicht bewiesen haben, folgt daraus, dass  $\mathbb{R}_+$  das Bild der reellen Exponentialfunktion ist.

AUFGABE 25.13. Beweise das Additionstheorem für den Sinus, also die Gleichheit

$$\sin(z + w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$$

für  $z, w \in \mathbb{C}$ .

### Aufgaben zum Abgeben

Die nächste Aufgabe befasst sich mit der  $g$ -adischen *Entwicklung* von reellen Zahlen, vergleiche Aufgabe 24.16.

AUFGABE 25.14. (6 Punkte)

Es sei  $g \in \mathbb{N}$ ,  $g \geq 2$ . Es sei eine Ziffernfolge

$$z_i \in \{0, 1, \dots, g-1\} \text{ für } i \in \mathbb{Z}, i \leq k,$$

(wobei  $k \in \mathbb{N}$  ist) gegeben und es sei

$$r = \sum_{i=k}^{-\infty} z_i g^i$$

die durch diese Ziffernfolge definierte reelle Zahl. Zeige, dass die Ziffernfolge genau dann ab einer gewissen Stelle *periodisch* ist, wenn  $r$  eine rationale Zahl ist.

AUFGABE 25.15. (5 Punkte)

Es sei  $M \subseteq \mathbb{N}_+$  diejenige Teilmenge der natürlichen Zahlen, die aus allen Zahlen besteht, in deren Dezimalentwicklung keine 9 vorkommt. Zeige, dass

$$\sum_{n \in M} \frac{1}{n}$$

summierbar ist.

AUFGABE 25.16. (4 Punkte)

Sei  $a_k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , eine Familie von komplexen Zahlen. Zeige, dass diese Familie genau dann summierbar ist, wenn die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

absolut konvergiert.

AUFGABE 25.17. (4 Punkte)

Es sei  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  eine konvergente Reihe mit  $a_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ . Zeige, dass die durch

$$y_n := \sum_{k \geq n/2}^n a_k$$

definierte Folge eine Nullfolge ist.

AUFGABE 25.18. (4 Punkte)

Es sei

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

eine absolut konvergente Potenzreihe. Bestimme die Koeffizienten zu den Potenzen  $z^0, z^1, z^2, z^3, z^4, z^5$  in der vierten Potenz

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right)^4.$$

AUFGABE 25.19. (8 Punkte)

Bestimme, ob die Familie

$$\frac{1}{a^2 + b^2}, \quad a, b \in \mathbb{N}_+,$$

summierbar ist oder nicht.

AUFGABE 25.20. (5 Punkte)

Für  $N \in \mathbb{N}$  und  $z \in \mathbb{C}$  sei

$$R_{N+1}(z) = \exp z - \sum_{n=0}^N \frac{z^n}{n!} = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

das *Restglied* der Exponentialreihe. Zeige, dass für  $|z| \leq 1 + \frac{1}{2}N$  die *Restgliedabschätzung*

$$|R_{N+1}(z)| \leq \frac{2}{(N+1)!} |z|^{N+1}$$

gilt.

AUFGABE 25.21. (3 Punkte)

Berechne von Hand die ersten 4 Nachkommastellen im Zehnersystem von  $\exp 1$ .

AUFGABE 25.22. (4 Punkte)

Zeige, dass die durch die Exponentialreihe definierte reelle Exponentialfunktion die Eigenschaft besitzt, dass für jedes  $d \in \mathbb{N}$  die Folge

$$\left( \frac{\exp n}{n^d} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

bestimmt divergent gegen  $+\infty$  ist.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Man sagt daher, dass die Exponentialfunktion *schneller wächst* als jede Polynomfunktion.