

VII. *Solutio Problematis de curvis inveniendis, quæ quadam ratione in situ inverso dispositæ se interfecare possunt in angulo dato.*

JAM primum ad manus pervenerunt *Acta Eruditorum* ad hunc mensem *Augusti*, ubi invenio a me peti, ut ea aperiam, quæ notis fictis celata in *Supplementorum ad Acta Eruditorum*, Tom. 8. Sect. I. edita sunt. Explicentur autem ea tabulâ sequenti.

	z	y	x	v	u	t	s	r	q	p	o	n	m	l	j	i	h	g	f	e	d	c	b	æ	a	
b	a	4	o	æ	i	z	u	r	s	j	c	8	y	9	2	6	e	3	m	f	7	v	w	5	r	h
g	e	o	u	w	4	d	3	i	c	6	z	s	7	5	y	æ	m	t	r	j	9	a	h	v	8	f
n	i	j	æ	5	o	l	r	s	e	v	6	d	f	a	h	4	y	z	w	u	7	9	t	3	8	c
q	o	8	3	u	v	p	6	æ	r	c	w	h	l	i	5	m	2	j	d	f	e	9	a	z	4	y
x	u	y	4	r	c	t	f	w	j	2	o	s	7	r	3	5	l	m	i	h	e	d	9	æ	a	6
																									v	z

In hac tabulâ sex sunt notarum ordines : supremus literas continet, quibus verba celata scribi debent, reliqui literas numerosque continent, quæ verarum literarum loco usurpantur. Literas autem b, g, n, q, x, quæ e lævâ horum ordinum inferiorum collocantur, propter earum usum indices appellare licet. Scripturæ pars celata ab horum indicum duobus incipit, quorum posterior ostendit notas illum sequentes in eo ordine, cui præfigitur, quæri oportere, ut veræ literæ cognoscantur, quæ supra has notas in ordine literarum primo

primo semper habentur : Ex hoc autem ordine notæ fictæ defumendæ sunt, donec alteri alicui indicium occurritur, quod cum fit, hoc novo indice utendum est ut priori. Et hac regulâ tota scriptura explicabitur, nisi quod quodocunque plures indices sunt contigui, omnes præter ultimum negligi debent : item verborum aperte scriptorum interpositio hunc indicium usum non turbat. Hoc modo scriptura occulta, si pauci errores typographici emendentur, verba sequentia complecti invenietur.

Curvarum, quæ problemati conveniunt, quæcunque sumatur ordinata, illius fluxio secunda ab ejusdem fluxione primâ divisa (ut sermone arithmetico-utar) eandem dat quotientem, sed contrario signo, ac fluxio secunda a fluxione primâ divisa ordinatæ ex alterâ principii abscissæ parte jacentis, & ad eandem ab eo principio distantiam. Hujusmodi autem curvæ inveniri possunt tribus regulis.*

Prima regula curvam, qualem problema requirit, ope spatii hyperbolici à curvâ quacunque deducit, quæ habeat ad æquales distantias a principio suæ abscissæ ordinatas æquales, & ab eâdem parte abscissæ positas. Est enim ordinata curvæ quæsitæ, ut area alius curvæ ordinatam habentis æqualem segmento asymptoti hyperbolæ terminato a spatium hyperbolico æquali area curvæ primo assumptæ.

Regula autem secunda pendet a primâ, & curvam problemati satisficientem sine ope spatii hyperbolici ex curvis derivat, quæ habeant ad æqualia interval- la a principio suæ abscissæ ordinatas æquales, sed a contrariis partibus abscissæ positas.

* Scilicet, si abscissa a suo principio in oppositas partes æqualibus mo-
mentis fluit.

Et hæc secunda regula theorema sequens præbet, nimirum, si aliqua curva sumatur, qua problema solvi possit per regulam primam, & si hujus ordinatæ insistant abscissæ ad perpendicularum, inuenietur curva problemati satisfaciens, si ad eandem abscissam construatur alia linea curva, eâ lege, ut illius ordinata ex alterâ parte abscissæ ubique æqualis sit aggregato assumptæ lineæ curvæ & ejusdem ordinatæ; excessui autem hujus curvæ præ ordinatâ suâ æqualis sit unaquæque curvæ construendæ ordinata, quæ ex alterâ parte abscissæ jacet; omnes enim curvæ hac ratione constructæ problemati conveniunt.

Hoc autem theorema demonstratur propositione sequenti, quod in omni triangulo reëctangulo quadratum ab alterutro latere angulo reëcto adjacenti æquale est reëctangulo sub summâ alterius lateris angulo reëcto adjacentis laterisque angulo ei subtendentis, & sub differentiâ eorundem laterum.

Denique tertia regula derivatur a secundâ, ope propositionis nonæ libri de quadraturâ curvarum Newtoni.

S C H O L I U M.

Exemplum generale, quod exhibui, curva logarithmica, & cyclois plurimis modis investigari possunt his regulis.

Unus casus curvæ logarithmicæ commode invenitur per regulam primam, assumptâ lineâ reëctâ loco curvæ in illâ regulâ memoratæ.

Alter hujus lineæ casus deducitur ex regulâ secundâ ope speciei quinquagesimæ nonæ linearum tertii ordinis, quæ omnium curvarum in illâ regulâ utilium est fere simplicissima præter parabolam cubicam & hyperbolam conicam.

Cyclois

Cyclois optime invenitur theoremate, quod a regulâ secundâ deduci diximus.

Exemplum istud generale facile invenitur regulâ tertiâ, aliis vero regulis non sine ambagibus.

Regulis secundâ & tertiâ commodissime inveniuntur curvæ geometricæ rationales; quæ deducuntur etiam a theoremate in regulam secundam pendente; quâocumque enim curva assumpta tam longitudinem quam ordinatam rationalem habet, cujusmodi simplicissima est parabola semicubica, curvæ quoque inveniendæ ordinata rationalis erit.

Denique his regulis, vel etiam conditione in principio positâ facile est invenire, an curva aliqua proposita problemati satisfaciet, & quibus positionibus id fiet: unde intelligi potest, an eadem curva diversis modis problemati conveniat.

Horum brevem explicationem jam apponam, describendo, ex amici chartâ, problematis sequentis solutionem.

P R O B L E M A.

Datis duabus lineis rectis AB, CD (in Fig. 1.) parallelis, ad abscissam AB curva EF describenda est, quæ talis sit, ut in situ inverso ad abscissam CD descripta seipsam semper interfecet in angulo quolibet dato.

Ad abscissam CD describantur curvæ GH, KL similes & æquales curvæ EF, quarum altera huic curvæ EF occurrat in puncto quolibet I, altera vero per punctum M transeat, ut partes EM, KM curvarum EF, KL similes sint & æquales; & per punctum M, quod partes curvæ EF dirimit, quæ se mutuo interfecare debent, ducantur lineæ NMO, nmo, quæ cum rectis AB, CD angulos sub NOB & sub CNO, item angulos sub noA, & sub onD constituent ei æquales, in quo curva seipsam secare ponitur. Ducatur IPTS lineis AB, CD paral-

U

lela;

lela; item huic proxima & parallela $jxpts$; deinde ducatur Iv lineæ NO parallela, & denique Iw , Sy parallelæ lineæ no , ut angulus sub Iwj æqualis sit angulo sub Ivx . Jam anguli sub Iwx & sub Ijv simul sumpti æquales erunt angulo sub xIm , ideoque & angulo sub Iwv æquales; unde angulus sub xIw æqualis erit ei sub Ijv ; & eodem modo angulus sub jIv ei sub Iwx æqualis invenietur; adeo ut triangula Ijv , xIw sunt similia, & $jv : Iv :: Iw : wx$. Porro pro abscissis æqualibus MP , MT scribatur z , pro ordinatâ PI , y , & $-v$ pro ordinatâ TS , pertinente ad curvæ KL arcum KM , qui arcui EM curvæ EF respondet. Crescentibus autem abscissis MP , MT , & simul incrementibus ordinatis PI , TS , earum fluxiones primæ eadem habebunt signa cum suis ordinatis, sed utræque fluxiones secundæ idem habebunt signum; nam fluxio secunda unius ordinatæ idem habebit signum cum suâ ordinatâ, sed alterius ordinatæ fluxio secunda signum habebit a signo suæ ordinatæ diversum; propterea quod curvarum KM , MF alterius concavitas versus convexitatem alterius convertitur, ut manifestum est. His autem cognitis invenietur $jv : Iv (= Pp) :: \dot{y} : z$, $Iw (= Tr) : wx (= sy) :: z : -\dot{v}$, & $y : z :: z : -\dot{v}$, item $-\dot{y}\dot{v} = z^2$, & denique positâ z invariabili $-\dot{y}\ddot{v} - \ddot{y}\dot{v} = 0$, vel $\dot{y}\ddot{v} + \ddot{y}\dot{v} = 0$, ideoque $\frac{\ddot{y}}{\dot{y}} = -\frac{\ddot{v}}{\dot{v}}$, quando y & \dot{y} ad curvam EF , sed \dot{v} & \ddot{v} ad curvam KM pertinent. Idem vero locum quoque habet, quando omnes hæ fluxiones ad curvam EF referuntur, si abscissa in oppositas partes a suo principio fluere statuitur; nam sumptâ $MQ = MP$, & $Mq = Mp$, ductisque QR , qr ad AB , CD parallelis, puncta R , r in curvâ EF punctis S , s in curvâ KM respondent. Ponendo igitur abscissam in
 contra-

contrarias partes a suo principio æqualibus momentis fluere, *Curvarum, quæ problemati conveniunt, quæcunque sumatur ordinata, illius fluxio secunda a fluxione primâ divisa eandem dat quotientem, &c.* ut supra. Hæc autem curvarum quæsitaram conditio est, unde deducuntur regulæ sequentes ad problematis solutionem.

Regula Prima.

CUM requiritur, ut MQ existente $= MP$ sit

$$\frac{\ddot{y}}{y} = -\frac{\ddot{v}}{v}, \text{ quando abscissa in oppositas partes a puncto } M \text{ æquabiliter fluit, ita ut ejus fluxio in partibus abscissæ, quæ a contrariis lateribus puncti } M \text{ jacent, signa diversa tribuenda sint, ponere licet } \frac{\ddot{y}}{y} = z \text{ ductæ in}$$

quantitatem quamcunque, quæ eadem maneat, & sub eodem signo, pro eadem magnitudine z , sive illa affirmativa sive negativa sit. Describatur igitur (in *Fig. 2.*) ad abscissam NO curva quælibet KL , cujus ordinatæ angulum quemcunque datum cum abscissâ constituent, & quæ habeat eas ordinatas æquales, & ab eodem latere abscissæ NO positas, quæ æqualiter distant a puncto M ,

ut ordinatæ PW, QX ; deinde fiat $\frac{\ddot{y}}{y}$ ordinatæ $PW \times z$ proportionalis, & $\frac{\ddot{v}}{v}$ ordinatæ $QX \times z$.

Jam (in *Fig. 3.*) exponatur hyperbola YZ ad asymptotos $\Gamma\Delta, \Gamma\Theta$, angulum sub $\Theta\Gamma\Delta$ angulo dato sub NPW æqualem comprehendentes, descripta, & in alterutrâ asymptoto, ut $\Gamma\Delta$, sumatur ad libitum punctum Λ , & ducatur $\Lambda\Xi$ alteri asymptoto $\Gamma\Theta$ parallela, & parallelogrammum $\Gamma\Xi$ compleatur: deinde in curvâ KL ad abscissam NO , & ad punctum M ordinatim

U 2 applicetur

applicetur $M\Pi$; fumatur spatium hyperbolicum $\Lambda \Xi \Upsilon \Sigma$, rectâ $\Sigma \Upsilon$ asymptoto $\Gamma \Theta$ parallelâ absciffum, æquale spatio $W P M \Pi$, & fiat $P\Phi = \Gamma \Sigma$, eâque ratione describatur curva $\omega \Psi \Phi \Omega$; dico $P I$ curvæ quæsitæ ordinatam esse ut spatium $M P \Phi \Psi$. Hoc autem manifestum est; fluxio enim spatii $M \Pi W P$ æqualis est fluxioni spatii $\Lambda \Xi \Upsilon \Sigma$, ideoque $P W \times \dot{z} =$ fluxioni lineæ $\Gamma \Sigma$ ductæ in $\Sigma \Upsilon$ vel in $\frac{\Gamma \Lambda \times \Lambda \Xi}{\Gamma \Sigma}$;

erit igitur $P W \times \dot{z}$ ut fluxio lineæ $\Gamma \Sigma$ sive lineæ $P \Phi$

per ipsam $P \Phi$ divisa; sed $P W \times \dot{z}$ est ut $\frac{\ddot{y}}{y}$; unde erit

$P \Phi \times \dot{z}$ ut \dot{y} , & necessario y sive $P I$ ut spatium $M P \Phi \Psi$. *Prima igitur regula curvam, qualem problema requirit, ope spatii hyperbolici, &c. ut supra.*

In exemplum hujus regulæ loco curvæ $K L$ (in *Fig.* 2.) fumatur linea recta lineæ $N O$ parallela, & erit linea $\omega \Psi \Phi \Omega$ ea, quæ logarithmica dicitur, cui $N O$ asymptotos est; ideoque & linea $E F$ etiam logarithmica, per punctum M transiens, & asymptoton habens lineæ $N O$ parallelam; propterea quod area $M P \Phi \Psi$ hic erit ut $P \Phi - M \Psi$ (*a*). Si vero ordinatæ $\varepsilon n \zeta, \beta \alpha \gamma$ ducantur æqualiter distantes a puncto M , ordinatæque $M \Psi$ proximæ, erunt $\varepsilon n, \alpha \beta$ æquales quando primum nascuntur, quoniam spatia $\varepsilon \zeta \Psi M, M \Psi \gamma \alpha$ tunc æqualia sunt; ex ostensis autem est $\varepsilon n \times \alpha \beta = M \varepsilon q$ vel $M \alpha q$, unde $\varepsilon n = M \varepsilon$; & εn ad $\frac{M \Psi \zeta n}{M \Psi}$

ut radius ad sinum anguli sub $N M \Psi$. Quoniam igitur $P I$ semper est ut spatium $\Psi M P \Phi$, erit $P I$ ubique ad $\frac{\Psi M P \Phi}{M \Psi}$ ut radius ad sinum anguli sub $N M \Psi$; &

(a) Vid. Barrov. Lectiõ. Geometr. p. 123.

denique

denique limes ordinarum negativarum ad spatium totum comprehensum a parte Ψ ω lineæ logarithmicæ ω Ψ Ω ab ordinatâ $M \Psi$, & ab asymptoto $M O$ ad ordinatam $M \Psi$ applicatum ut radius ad sinum anguli sub $N M \Psi$: est autem rectangulum sub $M \Psi$ & sub lineæ logarithmicæ ω Ψ Ω subtangente ad spatium prædictum etiam ut radius ad sinum anguli sub $N M \Psi$: adeo ut limes ordinarum negativarum lineæ curvæ $E F$ æqualis erit huic subtangenti ; unde si ΨM retro producatum ad δ , ut $M \delta$ huic subtangenti sit æqualis, & ducatur $\theta \delta \lambda$ lineæ $N O$ parallela, erit illa curvæ $E F$ asymptotos ; erit autem curvæ hujus $E F$ subtangens lineæ $M \delta$ æqualis ; propterea quod $M \varepsilon = \text{est } \varepsilon n$. *Unus igitur casus curvæ logarithmicæ commode invenitur per regulam primam, &c. ut supra.*

Hæc autem regula primum ostendit modum, quo problema solvitur.

Regula Secunda.

Describatur curva quæcunque $\kappa M \mu$ per punctum M transiens in *Fig. 2.* vel $\kappa n c$, in $p \mu$ in *Fig. 4.* ubi curva invenienda duobus cruribus $e M F$, $E M f$ constat ; ut curvarum $\kappa M \mu$, & $\kappa n c$, in $p \mu$ ordinatæ ut $P \nu$, $Q \rho$, quæ æqualiter a puncto M principio abscissæ distant, sint æquales, sed a contrariis partibus abscissæ positæ, ita ut mutato abscissæ signo ordinatæ signum etiam mutetur.

Exponatur porro (in *Fig. 5.*) hyperbola æquilatera a b cujus axis transversus a g, conjugatus h q, centrum d, asymptoti d r, d s ; sumatur d t = $P \nu$, & ducatur t v w ad h q perpendicularis, junctâ d w, sumatur quoque d x = $M n$, & ducatur x y item rectæ lineæ h q perpendicularis, junctâ d y. Jam sit curva $K L$ (in *Fig. 2.*) vel $K k L l$ (in *Fig. 4.*) talis ut spatium
 $\Pi M P W$

ΠMPW æquale fit spatio ad w , si curva $\kappa \mu$ per punctum M transit, aliter æquale spatio da $w - da y$; hac enim ratione curvæ KL , & $KkLl$ non desinent conditionem habere, quæ in regulâ priori requiritur, nempe ut ordinatæ ad æquales distantias a puncto M sint æquales, & ab eâdem abscissæ parte positæ. Nam area hyperbolica ad w affirmativa est, quando $d t$ vel $P \nu$ est affirmativa, & eadem area negativa est, quando $d t$ vel $P \nu$ negativa est, quia area tota hyperbolica ab eâdem parte lineæ $h q$ jacet; ideoque area curvarum KL , $KkLl$ ad ordinatam $M \Pi$ terminata signum suum mutabit, quando abscissa MP , magnitudine feruatâ, signum mutat; & curvæ ordinata nec magnitudinem nec signum mutabit, mutatione signi abscissæ. Sit porro $a d q =$ parallelogrammo $\Gamma \Xi$ in hyperbolâ priori: quo efficietur ut $t w + t v$ sit ad $a d$ ut $\Gamma \Sigma$ ad $\Gamma \Lambda$ (a); si igitur $\Gamma \Lambda$ fiat $= a d$, erit $t w + t v = \Gamma \Sigma = P \Phi$. Porro ducantur ordinatæ $\epsilon n \zeta$, $\alpha \beta \gamma$ ordinatæ $M \Psi$ proximæ; deinde in *Fig. 2.* ubi curva $\omega \Psi \Omega$ simplex est, cum ϵn sit ad $\alpha \beta$ ut spatium $M \Psi \zeta$ ad spatium $M \Psi \gamma \alpha$, erit $\epsilon n = \alpha \beta$; unde & earum utraque $= M \epsilon = M \alpha$. Ideoque ϵn ad $\frac{M \Psi \zeta \epsilon}{M \Psi}$ ut radius ad sinum anguli sub $N M \Psi$, & ubique

$P I$ ad $\frac{M \Psi \Phi P}{M \Psi}$ in eâdem ratione. In *figurâ quartâ*

ubi curva $\omega \psi \Psi \Omega$ ex duobus cruribus composita est, ϵn est ad $\alpha \beta$ ut spatium $\Psi M \epsilon \zeta$ ad spatium $\psi M \alpha \gamma$ five ut $M \Psi$ ad $M \psi$, propterea quod $M \epsilon =$ est $M \alpha$. Cum igitur necesse sit, ut $\epsilon n \times \alpha \beta =$ sit $M \epsilon q$, scilicet ut crura $M F$, $M E$ in angulo proposito se mutuo interfecerint, erit ratio ϵn ad $M \epsilon$ subduplicata rationis ϵn ad $\alpha \beta$ vel subduplicata rationis $M \Psi$ ad $M \psi$:

(a) Vid. Philos. Transact. No. 338. prop. 4.

ideoque

ideoque ϵn ad spatium $M \Psi \zeta \epsilon$ applicatum ad mediam proportionalem inter $M \Psi$, $M \downarrow$ ut radius ad finum anguli sub $N M \Psi$; & generatim $P I$ ad spatium $M \Psi \Phi P$ applicatum ad mediam proportionalem inter $M \Psi$ & $M \downarrow$ in eadem ratione. Est autem $M \Psi = y x + d x$, & $M \downarrow = y x - d x$, & ad media est proportionalis inter $y x + d x$ & $y x - d x$. Unde utrobique dictis $a d$, a ; $d t$ vel $P \nu$, R ;

$$\text{erit } P \Phi = \sqrt{a a + R R} + R; R = \frac{1}{2} a \times \frac{P \Phi - a}{\Phi P};$$

& $P I$ ad $\frac{M P \Phi \Psi}{a}$ ut radius ad finum anguli sub $N M \Psi$.

Regula igitur secunda pendet a primâ, & curvam problemati satisfaciendam sine ope spatii hyperbolici, &c. ut supra. Nam hic sine spatio hyperbolico curva invenitur, cujus quadraturâ problema solvitur.

Dux autem sunt in hac regulâ formulæ. Formula prior nimirum $P \Phi = \sqrt{a a + R R} + R$, curvarum geometricæ rationalium, quæ maxime hic requiruntur, inventioni accommodatur; facile enim est ita sumere quantitatem indeterminatam R , ut curva $\omega \Psi \Phi \Omega$ quadraturam admittat.

Ne casus magis compositi memorentur, ponatur R vel $P \nu = c z^{\frac{m}{n}}$, ut m & n numeri sint impares vel inter se primi, vel eorum alter unitas: hac enim ratione curva, cujus ordinata est $P \nu$, conditionem habebit in hac regulâ necessariam, & erit $P \Phi = \sqrt{a a + R R}$

$$+ R = \sqrt{a a + c c z^{\frac{2m}{n}}} + c z^{\frac{m}{n}} = z^{\frac{m}{n}} \sqrt{c c + a a z^{-\frac{2m}{n}}}$$

$$+ c z^{\frac{m}{n}}. \text{ Si igitur } \frac{m}{n} + 1 \text{ sit vel numero } \frac{2m}{n} \text{ æ-$$

qualis, vel ejusdem multiplex, id est, si sumatur $m =$

— 1, & n numero cuilibet impari æqualis ; pars ordinatæ $z^n \sqrt{cc + aa z^{-2m}} + c z^m$ sub vinculo inclusa, ideoque & ordinata tota quadraturam admit-
tet. (a)

Verbi causâ, ponatur $\frac{m}{n} = -\frac{1}{3}$, $c = 1$, & P Φ

$= z = \frac{1}{3} \sqrt{1 + aa z^{\frac{2}{3}}} + z^{-\frac{1}{3}}$. Unde erit area M Ψ

$$\Phi P = \frac{1 + aa z^{\frac{2}{3}}}{aa} + \frac{1}{3} z^{\frac{2}{3}}, \text{ \& PI} = \frac{1}{aa} + z^{\frac{2}{3}} +$$

$\frac{3 z^{\frac{2}{3}}}{2 a}$, curvaque quæsita hac æquatione comprehende-

$$\text{tur } a \times P I q - 3 z^{\frac{2}{3}} \times P I = \frac{1}{a^5} + \frac{3 z^{\frac{2}{3}}}{a^3} + \frac{3 z^{\frac{4}{3}}}{4 a} +$$

$a z^2$. In hac æquatione cum $z^{\frac{2}{3}}$ signum non mutabit, mutatione signi abscissæ z ; pro eadem ipsius magnitudine tam negativâ quam affirmativâ P I eandem habebit magnitudinem, & sub eodem signo ; unicuique autem magnitudini abscissæ z respondet & affirmativa & negativa ordinata : adeo ut curva quæsita habeat formam hic appositam (in *Fig. 6.*) ; e tribus constans cruribus a b c, d e, d f punctis b, d æqualiter a puncto

M distantibus ; quippe est M d = M b = $\frac{1}{a^3}$: quan-

do enim est $z = 0$, erit P I q = $\frac{1}{a^6}$; & P I = $\pm \frac{1}{a^3}$.

(a) Vid. in Tract. de quadr. curv. Newton, tab. curv. simplicior. quæ quadrari possunt,

Hæc autem regulæ hujus formula prior secundum exhibet curvas quæsitæ inveniendi modum.

In formulâ posteriori, cum R fit $= \frac{1}{2} a \times \frac{P\Phi}{a} - \frac{a}{P\Phi}$,

R vel P_v ejusdem magnitudinis manebit, sed signum mutabit, quando abscissa magnitudinem suam signo mutato retinet, si $P\Phi$ talis sumatur, ut mutando abscissæ

signum $\frac{P\Phi}{a}$ convertatur in $\frac{a}{P\Phi}$, & contra ut $\frac{a}{P\Phi}$ conver-

tatur in $\frac{P\Phi}{a}$. Et hæc formula posterior tertium conti-

net problema solvendi modum.

Verbi causâ, fit $P\Phi = a \times \frac{c-z}{c+z}$, quando z est affirmative, & erit R vel P_v eodem tempore $= \frac{1}{2} a \times \frac{c-z}{c+z} - \frac{c+z}{c-z}$, quando autem z negativa est, fiet

$P\Phi = a \times \frac{c+z}{c-z}$, & R vel $Q_p = \frac{1}{2} a \times \frac{c+z}{c-z} -$

$\frac{c-z}{c+z}$. Hinc autem R æqualis erit $\frac{+ 2 a c z}{c c - z z}$, &

R $z z + 2 a c z = c c R$; ideoque curva $\kappa M \mu$ linea tertii ordinis, imo species earum quinquagesima nona; propterea quod æquationis $c c R R + a a c c = 0$ radices sunt impossibiles (a). Linea autem curva hinc invenienda, si fiat (in Fig. 7.) NM vel MO = c, logarithmica est, cui recta AB est asymptotos. Cum

(a) Vid. Newton. Enumerat. linear. tert. ordin. ad Fig. 63.

enim $P\Phi$ fit $= a \times \frac{c-z}{c+z}$, erit eadem $= \frac{ac}{c+z} -$

$\frac{az}{c+z}$. Si igitur (in *Fig. 8.*) in rectâ lineâ quacunque

$\alpha\epsilon$ fumatur $\alpha\kappa = OM = c$, & ei ad perpendicularum erigantur $\alpha\beta, \kappa\mu$ quarum $\kappa\mu$ fit $= a$, & si asymptotis $\alpha\epsilon, \alpha\beta$ per punctum μ describatur hyperbola $\zeta\eta$, & sumptâ $\kappa\nu = MP = z$, ducatur $\nu\rho$ asymptoto $\alpha\beta$

parallela; parti $\frac{ac}{c+z}$ ordinatæ $P\Phi$ respondet area,

quæ erit ad aream $\kappa\mu\rho\nu$ ut sinus anguli sub NPI ad

radius, & alteri parti $\frac{az}{c+z}$ ejusdem ordinatæ respon-

det area, quæ erit ad $a \times \kappa\nu - \kappa\mu\rho\nu$ in eâdem ratio-

ne (*a*). Unde PI , quæ est ad $\frac{MP\Phi\Psi}{a}$ ut radius ad fi-

num anguli sub $NM\Psi$, erit $= \frac{2\kappa\mu\rho\nu}{a} - \kappa\nu$. Si igitur

sumatur $O\zeta = OM$, & ducatur ζM ordinatæ PI retro productæ occurrens in χ , ut fit $P\chi = PM = \kappa\nu$,

erit $\chi I = \frac{2\kappa\mu\rho\nu}{a}$: ideoque linea MI logarithmica,

cui AB asymptotos est, & ζM ordinatim applicata,

efficiens cum asymptoto AB angulum sub $A\zeta M$ ver-

sus contingentem æqualem dimidio anguli sub AON .

Alter igitur hujus lineæ casus deducitur, &c. ut fu-

pra.

Magis generatim, si r ordinatam curvæ alicujus denotat, quæ instar curvarum $\kappa M\mu$, & $\kappa n c$, in $p\mu$ ad abscissam NO descripta ordinatas habeat æquales, quæ

(*a*) Vid. Newton. de quadr. curv. tab. curv. simpl. quæ cum circ. & hyperb. compar. possunt, form. prim.

æqualiter distant a puncto M, sed a contrariis partibus abscissæ positæ, poni potest ordinata $P\Phi = a x$

$$\frac{b \pm cr + drr \pm er^3 + \&c \times f \pm gr + \&c)^{\lambda} \times b \pm kr + lrr \pm \&c)^{\mu}}{b \pm cr + drr \pm er^3 + \&c \times f \pm gr + \&c)^{\lambda} \times b \pm kr + lrr \pm \&c)^{\mu}}$$

Ex priori hujus regulæ secundæ formulâ deducitur quoque theorema, cujus supra fit mentio, ad inveniendas curvas tam rationales quam irrationales utile, quod quartus erit modus problema solvendi.

Theorema.

Quoniam est $P\Phi = \sqrt{aa + RR} + R$, & $R = P v$, manifestum est, si $\frac{R}{a}$ vel $\frac{P v}{a}$ sit ut fluxio ordinatæ, quæ abscissæ suæ ad perpendicularum insistat, alicujus curvæ, erit $\frac{\sqrt{aa + RR}}{a}$, ut ejusdem curvæ fluxio; curvæ au-

tem hujus ordinata æqualis erit areæ curvæ $x\mu$ ad a applicatæ, si angulus sub $MP v$ rectus sit, & cum area curvarum (in *Fig. 2, 4.*) $xM\mu$, & xnc , $mp\mu$ eodem signo afficiatur, tam quando abscissa est affirmativa, quam quando est eadem negativa, quoniam areæ ad diversas abscissæ partes in illis diversis casibus jacent; & præterea cum eisdem abscissæ magnitudinibus areæ æquales respondeant, curvæ, quales problema requirit, inveniri possunt curvarum ope, quarum ordinatæ ad easdem abscissæ magnitudines æquales sint, & ab eadem abscissæ parte positæ, si modo ordinatæ insistent abscissæ ad perpendicularum.

Descripta sit ejusmodi curva no , quæ tangat abscissam in puncto M (ut in *Fig. 9.*) si evanescat, quando abscissa est $= 0$, fluens quantitas fluxioni longitudinis curvæ no respondens; aliter, quæ habeat ordinatam primam Mm (ut in *Fig. 10.*) æqualem magnitudini

fluentis istius quantitatis, quando abscissa est = 0. Eri-
gantur ordinatæ Pp, Qq; deinde erit PI curvæ qua-
sitæ ordinatæ, quæ ab alterâ parte puncti M jacet, vel
= M p + P p, vel = M m p + P p; ordinata autem
QR, quæ ab alterâ parte puncti M cadit, vel = M q
— Q q, vel = M m q — Q q.

Observandum autem est hoc theorema aliquando
partem duntaxat curvæ quæsitæ describere.

Ex ratione autem, qua hoc theorema investigatur,
manifestum est duo crura curvæ hic descriptæ ejusdem
lineæ esse partes: nimirum utriusque naturam eâdem
æquatione definiri. Hanc autem curvam in situ inver-
so dispositam se intersectare in angulo æquali angulo sub
NOB inde manifestum est, quod rectangulum sub flu-
xione PI & sub fluxione QR, ordinarum scilicet æ-
qualiter a puncto M distantium, æquale est quadrato
fluxionis abscissæ: si enim curvæ n o ordinatæ w r, x t
applicentur ordinatis Q q, P p proximæ, & P x, Q w
sint æquales, & ducantur r s, t v abscissæ N O parallelæ,
erunt triangula p t v, q r s rectangula similia & æqualia:
*in omni autem triangulo rectangulo quadratum ab al-
terutro latera angulo recto adjacenti æquale est rectan-
gulo sub summâ alterius lateris angulo recto adjacentis
laterisque angulo ei subtendentis, & sub differen-
tiâ eorundem laterum.* Igitur $t v^2 = P x^2 = p t + p v$
 $\times p t - p v = p t + p v \times q r - q s$: est autem ultima
ratio P x ad p t + p v ea, quam fluxio abscissæ habet
ad fluxionem ordinatæ PI; & ratio P x vel Q w ad
q r — q s ea, quam fluxio abscissæ habet ad ordinatæ
QR fluxionem. Unde constat propositum. *Regula*
igitur *secunda theorema*, &c. ut supra.

Jam si n o sit circuli circumferentia, linea EF cyclois
erit, quando angulus sub NOB vel sub NPI rectus est.
Porro si curvæ n o longitudo cum rectâ conferri potest,
quarum curvarum simplicissima est parabola semicubica,

curva

curva inventa rationalis erit. Speciatim parabola femicubica, si rite disponatur, ejus curvæ partem dimidiam exhibebit, quam in exemplum formulæ prioris regulæ secundæ delineavimus; scilicet (in *Fig. 6.*) crus $d e$, partemque inferiorem $b c$ cruris $a b c$. Reliquæ autem illius partes describi possunt, si retro producat^r ordinata $I P$ donec pars producta æqualis sit $M m p - P p$, & producat^r $R Q$ ab altero abscissæ latere, donec pars producta æqualis sit $M m q + Q q$

Nunc transeundum est ad regulam tertiam, quæ etiam curvas geometrice rationales largitur.

Regula Tertia.

Regula hæc tertia duos quoque complectitur problema solvendi modos a prioris regulæ formulis propositione nonâ tractatus de quadraturâ curvarum *Newtoni* derivatos.

Propositione istâ ad formulam, regulæ præcedentis priorem adhibitâ invenitur area curvæ, cujus abscissa est z , & ordinata $\sqrt{a a + R R} + R$, æqualis areae curvæ, cujus abscissa est R & ordinata $\frac{z}{R} \sqrt{a a + R R}$

$+ \frac{z}{R} R$. Hinc autem quinto modo solvitur problema.

Verbi causâ, ut exemplum generale, quod antea (a) exhibui, investigetur, positis $M P = z$, & $P v = R$, ut prius, fiat $\frac{z}{R} = R^{\frac{m-n}{n}} \times \sqrt{c + d R^2}$, & erit $z = R^{\frac{m}{n}}$

(a) In Act, Erud. Mens. April. 1721.

$\times \frac{n}{m} c + \frac{n}{m+2n} d R^2$; sint autem m & n numeri im-
 pares vel inter se primi vel eorum alter unitas; ut fig-
 na abscissæ z & ordinatæ R simul mutantur, sicut in
 regulâ priori requiritur; jam erit ordinata $\frac{z}{R} \sqrt{aa + RR}$
 $+ \frac{z}{R} R = R^{\frac{m-n}{n}} \times \sqrt{c + d R^2} \times \sqrt{aa + RR} + R^{\frac{m}{n}}$
 $\times \sqrt{c + d R^2}$; area igitur curvæ, cujus abscissa est z &
 ordinata $\sqrt{aa + RR} + R$, æqualis erit areæ curvæ,
 cujus abscissa est R & ordinata $R^{\frac{m-n}{n}} \times \sqrt{c + d R^2} \times$
 $\sqrt{aa + RR} + R^{\frac{m}{n}} \times \sqrt{c + d R^2}$, si modo hæc poste-
 rior ordinata cum abscissâ suâ angulum contineat æqua-
 lem angulo sub $N M \Psi$; unde hujus posterioris curvæ
 quadraturâ linea exhibetur problemati satisfaciens. E-
 rit autem hæc linea curva geometricè irrationalis, nisi
 m & n certos quosdam numeros designant, vel certa
 quædam sit relatio inter coefficientes c, d ; hæc autem
 conditiones ratione sequenti inveniuntur. Erit (a)
 area curvæ, cujus abscissa R & ordinata $R^{\frac{m}{n}} \times \sqrt{c + d R^2}$
 $+ R^{\frac{m-n}{n}} \times \sqrt{c + d R^2} \times \sqrt{aa + RR}$, ad $R^{\frac{m+n}{n}}$
 $\times \frac{n}{m+n} c + \frac{n}{m+3n} d R^2 + R^{\frac{m}{n}} \times \sqrt{aa + RR}$ $\frac{3}{2}$
 $\times \frac{n}{m a a} c + \frac{d - \frac{m+3n}{m a a} \times c}{\frac{m+2n}{n} a a} R^2 + \text{Ec. ut sinus an-}$

(a) Per prop. quint. quadr. curv. Newton.

guli sub $NM\Phi$ ad radium. Hæc autem series terminabitur, & quadraturam finitam dabit, si n fit unitas & m numerus negativus ternario major, vel si ultimus terminorum hic scriptorum fit nihilo æqualis, id est, si

$$\text{fit } d = \frac{m + 3n}{m a a} c, \text{ vel si fit } d = 0, n = 1, \text{ \& } m = -3.$$

Et hic quidem ultimus casus curvam exhibet, quæ theoremate præcedenti a parabolâ femicubicâ invenitur.

$$\text{Magis generatim ponere licet } \frac{z}{R} = R^{\frac{m-n}{n}} \times c + d R^2$$

$$+ e R^4 + \mathcal{E}c \dots + f R^p, \text{ ubi } p \text{ numerum quemcun-}$$

$$\text{que parem denotat; unde fiat } z = R^{\frac{m}{n}} \times \frac{n}{m} c +$$

$$\frac{n}{m + 2n} d R^2 + \frac{n}{m + 4n} e R^4 \dots + \frac{n}{m + pn} f R^p,$$

$$\text{\& curvæ } \omega \Omega \text{ ordinata} = R^{\frac{m-n}{n}} \times c + d R^2 + e R^4$$

$\dots + f R^p \times \sqrt{a a + R R} + R$. Hinc (a) si n fit unitas & m numerus negativus numero $p + 1$ major, curva dabitur geometricè rationalis, vel si certa quædam relatio fit inter coefficientes $c, d, e, \mathcal{E}c, \dots, f$, quæ relatio facile invenitur ut antea.

Porro ad alteram regulæ secundæ formulam adhibendo propositionem nonam memoratam libri de quadraturâ curvarum, sextus oritur problema solvendi modus.

Literâ r denotante ut supra, fieri potest ordinata

$$P\Phi = a \times \frac{b + cr + dr r + \mathcal{E}c}{b - cr + dr r - \mathcal{E}c}, \text{ area curvæ, cujus}$$

abscissa est z & ordinata $P\Phi$, æqualis erit areæ curvæ,

(a) Per prop. proxim. citat.

cujus abscissa est r & ordinata $a \times \frac{z}{r} \times \frac{b+cr+drr+\mathcal{C}c}{b-cr+drr-\mathcal{C}c}$

Ponatur igitur $\frac{z}{r} = r^{\frac{m-n}{n}} \times \frac{b+cr+drr+\mathcal{C}c}{b-cr+drr-\mathcal{C}c} \times$
 $\frac{b-cr+drr-\mathcal{C}c}{rr^2+ddr^2+\mathcal{C}c}^p = r^{\frac{m-n}{n}} \times \frac{bb+2bd-cc}{rr^2+ddr^2+\mathcal{C}c}^p$, & curva, cujus ordinata est r
 conditionem hic necessariam habebit. Erit enim z
 $= r^{\frac{m}{n}} \times \frac{bb+2bd-cc}{rr^2+ddr^2+\mathcal{C}c}^{p+1} \times$
 $A+Brr+Cr^2+\mathcal{C}c$, cujus seriei coefficientes $A, B,$
 $C \mathcal{C}c$ dantur per propositionem quintam Tractatus de
 Quadraturâ Curvarum. Manifestum autem est nec
 terminos hujus seriei nec quantitatem $\frac{bb+2bd-cc}{rr^2+ddr^2+\mathcal{C}c}^{p+1}$ signa sua mutare mutatione
 signi quantitatis r ; quantitas autem $r^{\frac{m}{n}}$, si m, n numeri sint
 impares, signum mutabit, quando ipsa r signum mutat; ideoque ordinata r & abscissa z signa simul mutabunt.

Ordinata autem $a \times \frac{z}{r} \times \frac{b+cr+drr+\mathcal{C}c}{b-cr+drr-\mathcal{C}c} =$ erit
 $a r^{\frac{m-n}{n}} \times \frac{bb+2bd-cc}{rr^2+ddr^2+\mathcal{C}c}^{p-1} \times$
 $\frac{b+cr+drr+\mathcal{C}c}{b-cr+drr-\mathcal{C}c}^2$. Et hinc facile inveniri pos-
 sunt curvæ rationales.

Pro exemplo simplici ponatur $p = 1 = m = n, d,$
 $\mathcal{C}c = 0$; unde erit $\frac{z}{r} = \frac{bb-ccrr}{r}$, & $z = bbr$
 $-\frac{1}{2}ccr^2$. Ordinata autem curvæ metiendæ =
 $abb+2abcr+accrr$; ejusdem igitur area est
 ad $abbr+abcrr+\frac{1}{2}accr^2$ ut sinus anguli sub
 NM Ψ ad radium; ideoque erit $PI = bbr + bcr$
 $+\frac{1}{2}$

$\mp \frac{1}{3} c c r^3$. Hinc autem invenitur parabolam femicubicam problemati satisfacere, quam ita describere oportet. Datâ (in *Fig. 11.*) lineâ rectâ *AB*, & in eâ puncto *C*, una cum lineâ rectâ *CD* angulum sub *BCD* cum lineâ *CB* constituyente æqualem angulo, in quo curva se interfecare requiritur. Ducatur ad libitum *HGI* ad *CD* parallela, fumaturque in eâ *GH = 2 CG*; deinde dividatur angulus sub *ACD* in duas partes æquales lineâ rectâ *CE*, & denique ad diametrum *HI* & verticem *H* describatur parabola femicubica *KHL*, quæ transeat per punctum *C*, ita ut *CE* ordinatim applicetur ad diametrum *HI*. Hæc parabola ad eandem lineam similiter applicata, sed situ inverso, se interfecabit in angulo æquali angulo sub *BCD*.

Si placet curvas hac regulâ inventas theoremate præcedente construere, ex iis, quæ hic tradita sunt, curva huic negotio apta inveniri potest; erit enim curvæ illius ordinata æqualis areæ curvæ $x\mu$ ad *a* applicatæ, quando angulus sub *MPV* rectus est. Verbi causâ, hujus areæ fluxio, nimirum $Pv \times z$ in exemplo secun-

do prioris partis hujus regulæ erit $= R R \times R^{\frac{m-n}{n}}$
 $\times c + dR^2 + eR^4 \dots + fR^p \} = R R^{\frac{m}{n}} \times c + dR^2$
 $+ eR^4 \dots + fR^p$; ideoque curvæ hic requisitæ or-

dinata erit $= \frac{1}{a} R^{\frac{m+n}{n}} \times \frac{n}{m+n} c + \frac{n}{m+3n} dR^2$

$+ \frac{n}{m+5n} eR^4 \dots + \frac{n}{m+p+1 \times n} fR^p$.

In exemplo posterioris partis hujus regulæ erit *R*

$(= \frac{1}{2} a \times \frac{P\Phi}{a} - \frac{a}{P\Phi}) = \frac{2bcr + 2cdr^3 + \mathcal{E}c}{bb + 2bd - cc \times rr + ddr^4 + \mathcal{E}c}$

Y

ideoque

ideoque $R \times z = r r^m \times \sqrt[2bc + 2cdr^2 + \mathcal{C}c]{m} \times$
 $\sqrt{bb + 2bd - cc \times rr + ddr^4 + \mathcal{C}c}^{p-1}$; hæc igitur
 est fluxio ordinatæ curvæ quæsitæ.

Si fit $m = 1 = n = p$, $d, \mathcal{C}c = 0$, erit $R \times z = 2bcrr$, & ordinata curvæ quæsitæ $= bcr$; quoniam igitur $z =$ erit $bbr - \frac{1}{3}ccr^3$, erit curva quæsitæ in hoc casu parabola divergens cum nodo, quæ definitur hac æquatione $3ez = y^3 - 2ey + eey$ (a). Et hac curvâ describetur parabola semicubica supra inventa.

Verbi causâ, ad rectam lineam (in *Fig. 12.*) AB ducatur perpendicularis CD, & ad illam ut axim describatur ejusmodi parabola divergens FECEG. Deinde ducatur ad libitum HI angulum quemcunque datum cum rectâ AB constituens, & ducatur HKLM ad CD parallela; deinde sumatur HN = HK + arc. CK, HO = HL + arc. CKL, & ab alterâ parte puncti H, HP = CEM - HM; & curva hac ratione descripta parabola semicubica erit.

Hinc apparet quomodo curvæ, quarum investigationi regula hæc tertia aptatur, theoremate præcedenti construi possunt, postquam earum formæ cognoscuntur, sed hæc curvarum formæ, a quibus rationales deriventur, regulâ hac tertiâ optime inveniuntur.

Hæ sunt tres regulæ, quarum supra fit mentio. Ultima sententia, quæ sub notis fictis celata fuit, exemplo sequenti illustrari potest. Sit y vel $= a + bx + \sqrt{c + 2dx + ex^2}$ vel $= \frac{a + bx + cxx}{d + ex}$, quæ

(a) Vid. Enumerat. linear. tert. ord. Fig. 73.

duæ æquationes omnes complectuntur sectiones conicas. Inde vero inueniemus $\frac{\ddot{y}}{y}$ vel $= \frac{ec}{d+ex}$
 $- dd$

$$\frac{+b\sqrt{c+2dx+exx} \times c+2dx+exx}{2cdd+2aee-2bde} z, \text{ vel } =$$

$$\frac{d+ex \times bd-ae+2cdx+cexx}{2cdd+2aee-2bde} z; \text{ quæ æqua-}$$

tiones ostendunt in nullâ sectione conicâ, quomodo-
 cunque disponatur, quantitatem $\frac{\ddot{y}}{y}$ conditionem ha-

bere, quam hoc problema requirit; ideoque nullam sectionem conicam problemati satisfacere. Quod comprobari etiam potest examinando rectangulum sub fluxionibus primis ordinarum æqualiter ad diuersas partes a principio abscissæ distantium.

Hinc autem cognoscitur nullam lineam curuam geometricè rationalem problema solvere, quæ parabolâ semicubicâ sit simplicior.

Si vero talis inter quantitates a, b, c, d, e ratio statui potuisset ut $\frac{\ddot{y}}{y}$ conditionem in hoc problemate ne-

cessariam obtineret, nempe ut quantitas, quæ in z ducitur, eadem esse potuisset, & sub eodem signo, pro eâdem magnitudine tam negativâ quam affirmativâ ab-

scissæ z , quo eveniret ut $\frac{\ddot{y}}{y}$ foret $= -\frac{\ddot{v}}{v}$, si abscis-

sâ in oppositas partes a suo principio, æqualibusque momentis fluere ponitur: tum profecto sectio conica hinc determinanda vel problema solveret, vel sectionis

problemati satisfaciens ordinata ad ordinatam hujus rationem haberet datam.

Jam vero his regulis alias aliquot, quas ab amico accepi, ad problema solvendum adjungam.

Regula Quarta.

Iisdem positis ac in regulâ primâ, fit (in *Fig. 13.*) NO ad AB, CD perpendicularis; sint PI, QR ordinatæ æqualiter a puncto M distantes, & fit curva GH per punctum I ducta similis & æqualis curvæ FEF . Ordinatis PI, QR parallelæ & proximæ ducantur $\pi j l, \delta r$, & lineæ rectæ Ik, Rs lineæ NO parallelæ. Angulus sub $sRr =$ est angulo sub kIl ; unde anguli sub jIk, sRr simul sumpti æquales sunt angulo dato sub jIl ; & quantum angulus sub jIk dimidium anguli sub jIl superat, tantum angulus sub sRr ab eodem dimidio deficit. Si igitur (in *Fig. 14.*) radio quolibet m n circuli arcus no describatur, & sumatur angulus sub $nmp =$ dimidio anguli dati sub jIl , angulus sub $nmq =$ angulo sub jIk , & angulus sub $nmt =$ ei sub sRr , sectores qmp, pmt erunt æquales. Positâ autem $Ik = Rs = r$, erit jk ut tangens anguli sub jIk vel anguli sub nmq , & rs erit ut tangens anguli sub sRr vel anguli sub nmt ; ideoque & fluxio ordinatæ PI erit ut tangens anguli sub nmq , nimirum ut $n v$; & fluxio ordinatæ QR ut tangens anguli sub nmt , nimirum ut $n w$; curvæ igitur $\Psi\Phi\Omega$, cujus areæ ordinata PI proportionalis est, ordinata $P\Phi$ potest esse æqualis tangenti $n v$, & ordinata $Q\chi$ ab alterâ parte puncti $M = n w$. Quoniam autem sectores $p m q, p m t$ sunt æquales, constitui potest sector $p m q$ æqualis areæ $M\Pi W P$ curvæ cujuscunque KL conditionem habentis in regulâ primâ indicatam; & sector $p m t$ æqualis areæ $M\Pi X Q$ ejusdem curvæ. Denique

que si ducatur linea recta $\varepsilon n \zeta$ lineæ $M\Phi$ parallela & proxima; cum angulus sub $\varepsilon M n$ = fit dimidio anguli sub $j I l$, vel angulo sub $n m z$, erunt triangula $\varepsilon M n$, $n m z$ similia, & prima ratio εn ad εM eadem cum ratione $z n$ ad $n m$; ideoque $\varepsilon n = \frac{M\Phi \zeta \varepsilon}{n m}$, propterea quod

$$\varepsilon M = \text{est } \frac{M\Phi \zeta \varepsilon}{M\Phi}, \text{ \& } M\Phi = n z. \text{ Hic autem ha-}$$

betur septimus modus, quo problema solvi potest.

Si loco curvæ KL linea recta sumatur, quicumque fit angulus sub $n m z$ eadem describetur curva; adeo ut hac ratione invenitur una eademque curva, quæ diversis sitibus in angulo quocunque dato problema solvit. Hæc autem curva a circuli & hyperbolæ quadraturâ dependet; si enim ducantur $m \tau$, $n \sigma$ ad $m n$ perpendiculares, quarum $n \sigma =$ fit $m n$, & asymptotis $m n$, $m \tau$ hyperbola $\omega \sigma \downarrow$ describatur, & deinde $q \varphi \nu$, $p \theta \tau$ ducantur lineis $m \tau$, $n \sigma$ parallelæ; quando $MP =$ est arcui circuli $p q$, erit ordinata $PI = \frac{\theta \varphi \nu \tau}{m n}$, si $m n =$ fit $2 M \Pi$ (a).

Regula Quinta.

Describatur (in *Fig. 13.*) curva $\varkappa M \mu$ ut in regulâ secundâ, & (in *Fig. 15.*) radio = $m n$ describatur semicirculus $\alpha \beta \gamma$, cujus centrum δ , fit autem $\delta \beta$ diametro $\alpha \gamma$ perpendicularis. Sumatur $\delta \varepsilon = P \nu$, ducatur $\varepsilon \zeta$ ad $\delta \beta$ parallela, jungaturque $\delta \zeta$. Deinde fit curva KL ejus naturæ, ut area $M \Pi W P$ semper æqualis fit sectori $\beta \delta \zeta$. In circuli arcu (*Fig. 14.*) $n o$ du-

(a) Vid. Barrov. leſt. geometr. pag. 110.

ctis p_n finu arcus $p q$, & $p \theta$ finu arcus $n p$, producat
 $m p$ ad z , ducaturque $z \xi$ ad p_n parallela. Porro di-
 ctis $m n = m p, a$; $m \theta, b$; $n z, c$; p_n, R ; $n v, y$;
 erit ut $m p : p_n :: m z : z \xi$, sed ut $m \theta : m n (m p) ::$
 $m n : m z$; ex æquo igitur ut $m \theta (b) : p_n (R) :: m n$
 $: z \xi :: m v (\sqrt{a a + y y}) : z v (y - c)$ unde $b y -$
 $b c = R \sqrt{a a + y y}$, & denique $y = n v = P \Phi =$
 $\frac{b b c + a R \sqrt{a a - R R}}{b b - R R}$.

Hinc autem modo octavo solvitur problema.

Regula Sexta.

Per propositionem nonam Tractatus de Quadraturâ
 Curvarum area curvæ, cujus abscissa est z & ordinata

$$\frac{b b c + a R \sqrt{a a - R R}}{b b - R R}, \text{ æqualis est areae curvæ, cujus}$$

$$\text{abscissa est } R \text{ \& ordinata } \frac{z}{R} \times \frac{b b c + a R \sqrt{a a - R R}}{b b - R R}$$

Unde habetur modus nonus problema solvendi.

Literæ m & n eadem denotent, ac in regulâ ter-
 tiâ, & fiat $\frac{z}{R} = R^{\frac{m-n}{n}} \times \sqrt[b b - R R]{p}$, & ordinata

$$\frac{z}{R} \times \frac{b b c + a R \sqrt{a a - R R}}{b b - R R} \text{ fiet } = b b c R^{\frac{m-n}{n}} \times$$

$\sqrt[b b - R R]{p-1} + a R^{\frac{m}{n}} \times \sqrt[b b - R R]{p-1} \times \sqrt{a a - R R}$.
 Unde si n unitatem denotet, & p numerum quemcun-
 que integrum & affirmativum, curva geometricè ratio-
 nalis invenietur.

Regula Septima.

Ducatur (in *Fig. 15.*) $\beta \lambda$ femicirculum $\alpha \beta \gamma$ contingens in β , & producatur $\varepsilon \zeta$ ad μ , ductâ $\delta \nu \mu$. Sit autem curva (in *Fig. 13.*) $K L$ ejus naturæ, ut area $M \Pi W P =$ sit sectori $\delta \beta \nu$. Dictis igitur $m n, a; n z, c;$ & tangente arcus $p q, R;$ erit $n v = P \Phi = \frac{a a c + a a R}{a a - c R}$. Et hic est decimus problema solvendi modus.

Quando angulus intersectionis rectus est, & $c = a$, hæc regula sub formulâ posteriori regulæ secundæ comprehenditur.

Item si loco $\varkappa M \mu$ linea recta sumatur, quicumque sit intersectionis angulus, casus ille curvæ logarithmicæ invenietur, quem in regulâ secundâ tradidimus.

Regula Octava.

Ut antea, est area curvæ, cujus abscissâ z & ordinata $\frac{a a c + a a R}{a a - c R}$, æqualis areæ curvæ, cujus abscissâ est

R & ordinata $\frac{z}{R} \times \frac{a a c + a a R}{a a - c R}$. Hic autem est undecimus modus problema exequendi.

Literis m, n iisdem denotantibus, ut antea, sit $\frac{z}{R} = R^{\frac{m-n}{n}} \times \sqrt[m]{a^4 - c c R R}^p$; & ordinata $\frac{z}{R} \times \frac{a a c + a a R}{a a - c R}$ fiet $= R^{\frac{m-n}{n}} \times \frac{a^4 c + a^4 + a^3 c c}{a^4 - c c R R} \times R + a a c R R$
 $\times a^4 -$

$\sqrt{x a^4 - c c R R}^{p-1}$: quæ formula curvas geometricè rationales facile præbet.

Si fit $m = 1 = n = p$; eadem parabola femicubica atque ex regulâ tertiâ invenietur.

Regula nona.

Si (in *Fig. 16.*) NO ad lineas AB, CD perpendicularis sit, & ducatur curva KL, cujus ordinatæ PW, QX, quæ æqualiter a puncto M distant, æquales sint, & ab eâdem abscissæ parte positæ ; radio ordinatæ PW æquali describatur circuli segmentum abc, quæ angulum comprehendat angulo æqualem, in quo curva se ipsam fecare requiritur. Ducatur autem & alia curva $\mu M \mu$ cujus ordinatæ $P \nu$, $Q \rho$ æqualiter a puncto M distantes sint æquales & a contrariis partibus abscissæ NO positæ. Deinde sumptâ $M f = P \nu$ ductâque fh lineæ NO ad perpendiculum, junctâque ch, manifestum est, si curva quæsita EF ejus sit naturæ, ut contingens in puncto I semper sit parallela lineæ ch, proposito satisfaciet. Nam cum sit $WP = QX$, idem circuli segmentum ordinatis PW, QX convenit ; adeo ut si sumatur $Mg = Q \rho$, ducatur gk ad NO perpendicularis, & jungatur ck, linea recta contingens curvam quæsitam EF in puncto R parallela erit lineæ ck. Quoniam igitur $Q \rho =$ est $P \nu$, ideoque $Mg = M f$ in situ hujus curvæ EF inverso, & quando punctum R in punctum I cadit, contingens in puncto R lineæ puncta a, h conjungenti parallela erit, & cum contingente in puncto I angulum constituet æqualem ei sub ahc, nimirum angulo in segmento abc comprehenso. Invenitur igitur hujusmodi curva, si fiat ut $y : z :: fh : fc$. Quamobrem si pro PW ponatur m ; pro a M

2 = M c

= M c ponatur n ; pro intervallo inter punctum M & centrum segmenti ponatur p ; & pro P $\nu = M f$, q ; habebimus $y : z :: \sqrt{m m - q q \pm p} : n + q$, & $y = \frac{\sqrt{m m - q q \pm p}}{n + q} z$. Dantur autem rationes inter m, n, p ob datum segmenti a b c angulum, & invenietur y vel P I metiendo curvam, cujus abscissa est z & ordinata $\frac{\sqrt{m m - q q \pm p}}{n + q}$. Hic autem exhibetur duodecimus modus problema tractandi.

Si angulus sub a h c fit rectus, erit $p = 0, n = m$, & ordinata curvæ metiendæ $\sqrt{\frac{m - q}{m + q}}$. Quam profecto ordinatam problemati satisfacere, intelligi quoque potest ex posteriori regulæ secundæ formulâ.

Si loco linearum curvarum K L, & M μ rectæ sumantur, quando angulus sub a h c rectus est, erit curva E F cyclois; quæ facile determinatur formâ undecimâ tabulæ curvarum simpliciorum, quæ cum circulo & hyperbolâ comparari possunt in Tractatu de Quadraturâ Curvarum *Newtoni*.

Regula Decima.

Porro area curvæ, cujus abscissa est z & ordinata $\frac{\sqrt{m m - q q \pm p}}{n + q}$, æqualis est tum areae curvæ, cujus abscissa est m & ordinata $\frac{z}{m} \times \frac{\sqrt{m m - q q \pm p}}{n + q}$; tum areae curvæ, cujus abscissa est q & ordinata $\frac{z}{q} \times \frac{\sqrt{m m - q q \pm p}}{n + q}$. Unde habentur duo alii modi,

di, quibus problema solvi potest ; quorum posteriori, ratione sequenti, curvæ geometricæ rationales inveniri possunt.

Sint δ, ε numeri impares, n numerus par, & ponatur $\frac{z}{q} = q^{\frac{\delta - \varepsilon}{\varepsilon}} \times \sqrt[n]{n^n - q^n}$, item $m = 1 + \frac{1}{4} q q$. Unde

erit $z =$ areæ curvæ, cujus abscissa est q & ordinata $q^{\frac{\delta - \varepsilon}{\varepsilon}} \times \sqrt[n]{n^n - q^n}$, & ordinata $\frac{z}{q} \times \frac{\sqrt{m m - q q \pm p}}{n + q}$

fiet $= \frac{n^{n-1} - n^{n-2} q + n^{n-3} q q + \&c \dots - q^{n-1}}{1 - \frac{1}{4} q q \pm p}$.

His quatuordecim diversis modis generalibus amicus meus problematis solutionem absolvit. Demonstrationes autem illius ex compositione usus in hoc problemate curvarum Geometris notarum sic se habent.

De Casu primo Linearum logarithmicarum.

Sit (in *Fig. 17.*) AB linea logarithmica asymptoton habens CD; eique ordinatim applicetur EF, quæ sit subtangenti logarithmicæ æqualis. Ad lineam rectam EF & ad quodcunque in eâ punctum I constituitur alia linea logarithmica GHI priori similis & æqualis, sed situ inverso disposita. Deinde si contingentes HL, HM ducantur, dico angulum sub LHM angulo sub CEF esse æqualem.

Ordinatim applicetur HN, fiat EO = EN, ordinatim applicetur OP, & ducatur contingens PQ. Puncta P & H æqualiter distant a rectâ EI, unde punctum P in curvâ AB puncto H in curvâ GI respondet, & angulus sub OPQ = est angulo sub NHM, propterea quod curvæ AB, GI similes sunt & æquales. Quoniam vero curva AB est logarithmica

mica & EN, EO æquales, erit $NH \times OP = EF$ *q.*
 Est autem $EF = NL = OQ$, unde ut $NH : EF$
 $(NL) :: EF (OQ) : OP$. Cum igitur anguli sub
 HNL, QOP sint æquales, triangula HNL, QOP
 sunt similia, & angulus sub QPO , qui æqualis est an-
 gulo sub NHM , æqualis quoque erit angulo sub NLH .
 Unde anguli sub NHM & sub NLH æquales erunt,
 & angulus sub LHM angulo sub CNH sive angulo
 sub CEF æqualis. Q. E. D.

De Casu altero Linearum Logarithmicarum.

Sint (in *Fig. 18.*) AB, CD duæ lineæ rectæ paralle-
 læ, intra quas quælibet alia lineæ recta EF ducatur.
 Ad asymptoton AB describatur lineæ logarithmica
 GH , cujus subtangens sit æqualis lineæ EF , & ordi-
 natim applicatæ comprehendant cum asymptoto angu-
 los versus contingentes æquales parti dimidiæ anguli
 sub AEF . Quibus positis, si ad asymptoton CD
 alia describatur lineæ logarithmica ILM priori similis
 & æqualis, & si ducantur contingentes LN, LO , dico
 angulum sub OLN angulo sub BEF esse æqualem.

Ducatur NP , ut angulus sub ANP angulo sub AEF
 sit æqualis, & erit $NP = EF$. Sumatur NQ lineæ
 EF sive subtangenti lineæ logarithmicæ æqualis, jun-
 gaturque QL . Quoniam igitur QL punctum Q
 conjungit cum puncto contactus L , QL ordinatim ad
 asymptoton AB applicabitur, ideoque angulus sub
 LQN versus contingentem LN æqualis erit parti di-
 midix anguli sub AEF vel anguli sub ANP ; est au-
 tem $NP = EF = NQ$, quoniam igitur NP, NQ sunt
 æquales, & angulus sub LQN æqualis dimidio angu-
 li sub ANP , recta QL producta transibit per P effi-
 ciens triangulum PNQ isosceles. Eâdem ratione si
 ducatur OS , ut angulus sub COS æqualis sit angulo
Z 2
sub

sub AEF erit OS = EF; si vero sumatur OR = EF, ducaturque RL, ordinatim ea applicabitur ad asymptoton CD, & producta transibit per S, propterea quod linea IM similis est & æqualis lineæ GH. Erit autem angulus sub PRL (= angulo sub LSQ) = angulo sub LQS = angulo sub NPQ. Unde erit angulus sub LSQ = angulo sub NPQ, & triangula SLQ, PNQ similia sunt, angulusque sub SLQ = angulo sub PNQ = angulo sub BEF. Est autem & LS = LQ, OS = NQ, item angulus sub OSL (= angulo sub ORS) = angulo sub NQL. Triangula igitur OSL, NQL æqualia sunt, habentia bases OL, NL æquales, & angulos sub NLQ, OLS, etiam æquales: auferatur communis angulus sub NLS, & relinquetur angulus sub OLN = angulo sub SLQ = angulo sub BEF. Q. E. D.

De Cycloide.

Sint (in Fig. 19.) AB, CD duæ rectæ lineæ parallelæ, quas EF ad perpendiculum fecet. In diametrum EF describatur semicirculus EGF, & eo semicirculo describatur semicyclois FH. Jam si alia semicyclois ILQ priori similis & æqualis sed situ inverso intra parallelas describatur, & si contingentes LM, LN ducantur, dico angulum sub MLN rectum esse.

Sit IOP semicirculus, quo describitur semicyclois IQ, ejus diameter IP; ducatur LGO, lineis AB, CD parallela, & jungantur FG, GE, IO. Erit deinde contingens LM parallela rectæ FG, & contingens LN parallela rectæ IO, quæ parallela est rectæ EG. Angulus igitur sub MLN = est angulo sub FGE recto, ideoque angulus sub MLN rectus est. Q. E. D.

De Parabolâ Semicubicâ.

Si (in *Fig. 20.*) rectam lineam AB alia recta linea CD interfecat in puncto D cum lineâ AB angulum quemcunque constituens; & si sumatur $DE = \frac{1}{2} DC$; deinde ducatur EF, ut DF sit $= DE$; & denique diametro CF & vertice C describatur parabola semicubica GCH, quæ transeat per punctum E, habeatque ordinatim applicatas ad diametrum CF lineæ FE parallelas: his positis, si parabola hæc ad lineam AB in situ inverso descripta sit, ut eandem in situ jam dicto descriptam interfecet, & contingentes ad punctum intersectionis ducantur, illæ contingentes se interfecabunt in angulo æquali angulo sub CDB.

Sumatur in parabolâ GCH punctum quodvis I, ducatur IL C, & sumptâ EM = EL ducatur MNC. Deinde ordinatim applicentur OIP, NQR, ducaturque CEV, item EX diametro CO parallela. His positis erit $VX : XE :: EF : FC$, & $XE : XP :: DF : EF$. Unde ex æquo ut $VX : XP :: DF : FC$, dividendoque ut $VX : VP :: DF : DC$. Quoniam igitur est $DF = DE = \frac{1}{2} DC$, est etiam $VX = \frac{1}{2} VP$. Porro ut $IOq : EFq :: COc : CFc :: VOc : EFc$. Quatuor igitur ratione continuatâ proportionalium est VO secunda, quarum IO est prima & EF ultima. Est autem & $IO : OV :: LF : EF$. Ideoque sunt IO, OV, FL, FE quatuor ratione continuatâ proportionales; unde ut $VO : LF :: LF : EF :: VO - LF : LE$, componendoque ut $LF + EF : EF :: VO - EF (= VX) : LE$. Demonstratum autem fuit VX æqualem esse dimidio lineæ VP. Ut igitur $2 LF + 2 EF : EF :: VP : LE :: 2 LFE + 2 EFq : EFq$. Jam vero ut $IO : LF (:: IV : LE) :: LFq (2 LFE + LEq - EFq) : EFq$, propterea quod lineæ IO, VO

VO, LF, EF sunt quatuor ratione continuatâ proportionales; quoniam igitur ut $VP : LE :: 2 LFE + 2 EFq : EFq$, erit ut $PI : LE :: 3 EFq - LEq : EFq$. Eodem modo demonstratur ut $NR : EM :: 3 EFq - EMq : EFq$. Cum igitur $EM = EL$, erit $NR = PL$, sunt autem parallelæ, ideoque puncta N, I æqualiter distant a linea AB . Si igitur parabola semicubica GCH in situ inverso ad lineam AB describatur, punctum N incidere potest in punctum I . Parabolæ huic detur ille situs inversus bcg , & ducantur contingentes $ITS, EW, \Delta NT, tI\delta$; item lineæ WLY, WZM . Erit ex naturâ parabolæ hujus $OS = \frac{2}{3} OC, FW = \frac{2}{3} FC, \& QT = \frac{2}{3} QC$. Est autem $FD = \frac{1}{3} FC$; unde $FD, DE, \& DW$ sunt æquales, & angulus sub FEW rectus: & cum EL sit $= EM$, erunt & anguli sub EWL, EWM æquales. Quoniam autem LMF lineis IO, NQ parallela est, & lineæ OC, FC, QC similiter dividuntur in punctis S, W, T , erit WLY contingenti IST parallela, & WZM contingenti ΔNT . Est igitur angulus sub $WYD =$ angulo sub ITt , & angulus sub $WZD =$ angulo sub $N\Delta D =$ angulo sub $I\delta\Gamma$. Porro cum anguli sub EWL, EWM sint æquales, & anguli sub DEW, DWE etiam æquales propter linearum DW, DE æqualitatem, erit angulus sub $YWD =$ angulo sub WZD . Ideoque angulus sub CDB , qui æqualis est summæ angulorum sub WYD & sub YWD , æqualis erit summæ angulorum sub ITt , & sub $I\delta\Gamma$, nimirum angulo sub $\Gamma I\delta$ æqualis. Q. E. D.

Lond. Aug. 27. 1722.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7






Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 14




Fig. 13




Fig. 15




Fig. 17




Fig. 16




Fig. 20




Fig. 18




Fig. 19