

Invariantentheorie

Arbeitsblatt 25

Aufwärmaufgaben

AUFGABE 25.1. Zeige, dass der Quotient

$$\frac{1 - x_3}{x_1 + x_2 i}$$

für $x_1, x_2 \rightarrow 0$ und $x_3 = \pm\sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}$ gegen 0 konvergiert.

AUFGABE 25.2. Sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper und sei $F \in K[X, Y]$ ein homogenes Polynom. Zeige: F zerfällt in Linearfaktoren.

Der in der Vorlesung verwendete Begriff einer Singularität wird durch folgende Definition präzisiert (es ist eher ein wichtiges Kriterium).

Es sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper und seien $F_1, \dots, F_s \in K[X_1, \dots, X_n]$ Polynome mit der zugehörigen affinen Varietät

$$Y = V(F_1, \dots, F_s) \subseteq \mathbb{A}_K^n,$$

die irreduzibel sei und die Dimension d besitze. Es sei $P \in Y$ ein abgeschlossener Punkt. Dann heißt P ein *glatter Punkt* von Y , wenn der Rang der Matrix

$$\left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j} \right)_{i,j}$$

mindestens $n - d$ ist. Andernfalls heißt der Punkt *singulär*.

Die meisten Punkte einer affinen Varietät sind glatt, die singulären Punkte, wenn es sie denn gibt, bilden eine abgeschlossene Teilmenge, die der *singuläre Ort* von Y heißt. Die Varietät heißt *glatt*, wenn sie in jedem Punkt glatt ist.

AUFGABE 25.3. Zeige, dass der affine Raum \mathbb{A}_K^n über einem algebraisch abgeschlossenen Körper K glatt ist.

AUFGABE 25.4. Zeige, dass die Ringe $K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)$ (mit $n \geq 2$) genau in $P = (0, 0, 0)$ singulär sind.

AUFGABE 25.5. Zeige, dass die Ringe $K[X, Y, Z]/(X^2 + YZ^2 + Z^{m+1})$ (mit $m \geq 1$) genau in $P = (0, 0, 0)$ singulär sind.

AUFGABE 25.6. Zeige, dass der Ring $K[X, Y, Z]/(X^2 + Y^3 + Z^4)$ genau in $P = (0, 0, 0)$ singularär ist.

Aufgaben zum Abgeben

AUFGABE 25.7. (10 Punkte)

Bestimme zu den endlichen Untergruppen $G \subseteq \mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ die Halbachsenklassen auf S^2 und auf der projektiven Geraden $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$.

AUFGABE 25.8. (10 Punkte)

Bestimme zu den endlichen Untergruppen $G \subseteq \mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ und zu jeder Halbachsenklasse ein zugehöriges semiinvariantes Polynom.